



登園できない病気の一覧表



(学校保健法に準ずる)

病名	潜伏期間	感染経路	主要症状	伝染期間	登園停止期間	流行期
1 麻疹	10～12日	飛沫感染	発熱、食欲不振、結膜やのどのカタル症状。口腔内にケシ粒大の白斑ができ、2～3日後に全身に発疹。	発疹する数日前から発疹後3日間	主要症状が消えてから3日を経過するまで	春～夏
2 風疹 (三日ばしか)	14日～21日	〃	38度前後の熱と共に全身に発疹が出る。耳の後ろのリンパ腺がはれる。	発疹が消えるまで	主要症状が消えるまで	春
3 溶連菌感染症	2～7日	〃	発熱、咽頭痛、細かい鮮やかな発疹が出る。		主要症状が消えるまで	
4 水痘 (みずぼうそう)	14～21日	〃	発熱、顔・手足・胸に赤い粟粒、頭髪の中にも発疹、水疱となる。	かさぶたとなるまで	発疹すべてがかさぶたになるまで	
5 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	14～21日	〃	発熱、耳たぶの下がはれる。	耳下腺のはれがひくまで	耳下腺のはれが消失するまで	冬に多い
6 インフルエンザ	1～3日	飛沫感染 鼻汁・つば	発熱、くしゃみ、鼻つまり、せき、喉頭のはれ、関節痛。	熱のあるうち	主要症状が消えるまで	冬
7 伝染性膿痂疹 (とびひ)	10～14日	接触感染 (ブドウ球菌)	全身いたるところにエンドウ大の水疱が発生し、やぶれてただれ、かさぶたをつくる。	化膿した部分が治るまで	主要症状が消えるまで	夏
8 突発性発疹	7～17日	飛沫感染	風邪の症状で、熱のあと発疹が現れる。	発疹が消えるまで	発疹が消えるまで	夏
9 伝染性紅斑 (りんご病)	6～14日	飛沫感染 (ウイルス)	鼻を中心に左右対称の鮮やかな紅斑ができ、やや熱感がある。肩、手足に発疹の出るところもある。		主要症状が消えるまで (赤みがひどい時は休まれて下さい)	
10 手足口病	5～10日		口内粘膜疹、手、掌、足底に米粒大の水疱、軽い発熱。	水疱疹が消えるまで	主要症状が消えるまで	初夏～秋
11 咽頭結膜熱 (プール熱)		飛沫感染 (ウイルス)	夏かぜの一種。発熱と咽頭炎、結膜炎を起こす。結膜炎は伝染するので要注意のこと。	結膜炎が治るまで	主要症状が消えるまで	夏
12 流行性結膜炎		接触感染 (ウイルス)	白目、まぶたの裏側の結膜がはれる。眼脂が多く出る。	眼脂が出ている間	眼脂が出なくなるまで	
13 赤痢	1～7日	飲食物を通して口から侵入(赤痢菌)	発熱、下痢(しぶり)、血便、腹痛、脱水症状。	便に菌があるうち	便に菌がなくなるまで	

★この他の疾病もありますが、主なものをあげてみました。医師の指示があるまで、お休み下さい。
尚、停止の期間は、病気の種類にかかわらず、**届け出のあった日から**と致しますのでご了承下さい。
登校園には、園からお持たせする治癒届を、保護者の方が記入して下さい。
医師の診断はいりません。

